Elevage et reproduction du Teju

F. BILLIAU

Le téju est un lézard originaire de l'Amérique du Sud qui peut atteindre de grandes tailles. Trois espèces au moins sont assez voisines: teguixin, dont plus spécialement question ici, nigropunctatus et rufescens.
Les mâles atteignent facilement 1m à 1m20 pour un poids dépassant 2 kg. L'aspect général est noir avec des tâches blanches plus ou moins régulièrement réparties.
Les téjus sont assez pacifiques de caractère; il faut toutefois éviter d'être mordu car la force de leur mâchoire est impressionnante. Ils sont capables de briser le crâne d'un autre lézard d'un coup de dents. Parfois on les voit aussi croquer de petites pierres et les avaler avec un certain plaisir.
Les téjus adorent la chaleur, mais n'apprécient pas particulièrement le rayonnement direct d'une lampe chauffante ou ultraviolette. Ils ont l'air de préférer se chauffer le ventre sur des pierres chaudes et plates. C'est pourquoi il peut être recommandé de prévoir un chauffage du sol quand on veut garder ce lézard en terrarium.
La nuit, le téju s'enterre dans la terre meuble, se cache sous du foin ou plus rarement dans le trou d'un rocher. Il sort le matin pour prendre une vie plus active, mais se couche déjà tôt dans l'après-midi. Le fait de s'enterrer semble être très important car un téju malade ne s'enterre pas mais se traine lamentablement dans le terrarium.
En général ils sont peu agressifs envers des espèces de même taille telles que varans ou iguanes, mais ils s'attaquent à tous les lézards plus petits et ils mangent même des couleuvres.
Les téjus peuvent être nourris une ou deux fois par semaine.
Le menu se compose de viande crue coupée en dés et arrosée d'oeufs crus battus. Occasionnellement on peut ajouter un médicament contenant du calcium ainsi qu'un complexe de vitamines A, B, et D.
Dans la littérature on trouve également mentionné comme nourriture des souris, des grenouilles, parfois des fruits et des insectes.
Les téjus ne boivent pas beaucoup et en général ils n'ont pas l'air d'aimer beaucoup l'eau. Quand il leur arrive de tomber à l'eau ils en sortent aussi rapidement que possible quoique ils nagent très bien.

Il faut éviter de trop nourrir les tejus car ils sont très gourmands et engraissent facilement. Ils deviennent alors indolents et paresseux.
Autrement ce sont des animaux très agréables à soigner, qui viennent manger dans la main et qu'on peut garder pendant plus de dix ans.

Reproduction:

Le mâle se distingue de la femelle par sa taille plus grande, sa tête plus massive et le développement plus poussé des lobes pharyngales.
Des accoupplements peuvent s'observer pendant toute l'année.
On peut également les provoquer par un artifice que l'on utilise aussi chez les poissons tropicaux: on isole la femelle pendant quelque temps dans un grand terrarium bien chauffé. Dès qu'elle est bien acclimatée on introduit le mâle. Celui-ci se précipite généralement très rapidement sur la femelle en soufflant et haletant très fort. Il lui mord dans la queue et cherche à l'enlacer.
La femelle semble d'abord assez indifférente et évite le mâle devenant très entreprenant par des esquives habiles.
Toutefois le mâle insiste et finit par arriver à ses fins.
L'accouplement proprement dit est d'assez courte durée mais peut se reproduire plusieurs fois par jour. 5 à 6 semaines plus tard la femelle pond des oeufs blancs, ovales pesant entre 23 et 25 gr.
Une partie est enterrée mais comme la ponte peut durer deux jours et que la durée entre la ponte de deux oeufs peut être de trois heures il y en a qui restent à la surface et qu'il faut enlever rapidement car le mâle est très capable de les manger.
Une ponte comprend une vingtaine d'oeufs et peut être suivie deux mois plus tard par une seconde, mais tous les oeufs ne sont pas fécondés.

Essais d'éclosion:

Couveuse: armoire rectangulaire genre étuve de laboratoire équipée d'un thermostat et dans le bas d'un réservoir d'eau parcouru par un courant d'air pour assurer un degré hygrométrique élevé (85% env.)
Les oeufs sont placés dans des pots remplis d'un mélange humide de terreau et de tourbe stérilisé. Le fond des pots est cassé pour permettre une circulation d'air.
Température 30°

Résultats:

Oeufs enterrés profondément: raccornis au bout de 1 mois.

Oeufs placées directement sur la grille: raccornis en quelques heures.

Oeufs placées très peu sous la surface tourbe-terreau: commencent à raccornir au bout d'une centaine de jours.

Un oeuf ouvert: contenait un embryon vivant bien formé, les autres oeufs n'étaient malheureusement non fécondés.



Tupinambis
teguixin

mâle

Femelle avant la
ponte