

Maël Dewynter
Antoine Baglan
Élodie Courtois
Thierry Frétey
Mickaël Sanchez
Jérémy Souchet
Jean-Michel Probst

Numéro **27** Juillet 2026

GUIDE ILLUSTRÉ DES REPTILES & DES AMPHIBIENS DE LA RÉUNION



Crapauds / Bufonidae

ESPÈCE EXOTIQUE



CRAPAUD GUTTURAL

NA

Sclerophrys gutturalis

Grand crapaud à l'allure ramassée, globuleuse, aux membres courts et robustes, au museau court et arrondi

Mœurs terrestres

Mensurations

Lmc adulte : 7 à 10 cm

Glandes parotoïdes



Face cachée des cuisses parfois rouge

Grenouilles / PTYCHADENIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



~1790

GRENOUILLE DES MASCAREIGNES

Ptychadena mascareniensis

NA


Mœurs terrestres

Mensurations

Lmc adulte : 4 à 6 cm

Grenouille élancée, aux membres longs et fins, adaptés au saut, à museau pointu

Dos brun à vert, parcouru de plis longitudinaux le long desquels s'alignent des taches sombres, formant un motif pointillé



Agames / AGAMIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



~1995

AGAME DES ROCHES

Agama picticauda

NA

Mensurations


Lmc nouveau-né : 30–59 mm

Lmc mâle adulte : jusqu'à 15,4 cm

Lmc femelle adulte : jusqu'à 12,9 cm

Ltotale mâle adulte : 40–55 cm

Ltotale femelle adulte : 25–30 cm



Mâle adulte



Mâle adulte, sombre, sous l'effet du stress ou d'une confrontation avec un autre mâle



Femelle, livrée claire



Femelle, livrée sombre

Agames / AGAMIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



AGAME DU DECCAN

Calotes vultuosus

NA

Mensurations

Ltotale adulte : 25–50 cm

Crête très développée

Mâle adulte

Joues gonflées

Femelle & juvénile

Mâle en période de reproduction

Renflement des hémipenis

Femelle

Caméléons / CHAMAELEONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



~1829

CAMÉLÉON PANTHÈRE

ENDORMI

NA

Furcifer pardalis




Mâle adulte




Mâle adulte



Femelle



Femelle



Femelle

Mensurations

Lmc nouveau-né : ~20 mm

Ltotale nouveau-né : ~55 mm

Lmc mâle adulte : 10,3–25 cm

Lmc femelle adulte : 7,4–16,7 cm

Ltotale mâle adulte : jusqu'à 52 cm

Ltotale femelle adulte : jusqu'à 37,7 cm

Scinques / SCINCIDAE

ESPÈCE INDIGÈNE



Mensurations

Lmc adulte : 35–45 mm

Ltotale adulte : 78–150 mm

Œil toujours apparent, la paupière inférieure étant fixe et transparente, formant une véritable "fenêtre" protectrice

SCINQUE MARITIME

Cryptoblepharus boutonii boutonii

CR

RE ?

Petit lézard élancé, à l'aspect lisse et brillant, brun à brun gris, finement moucheté de clair et de sombre

Deux bandes dorsolatérales claires, bordées de noir, s'étendant de l'œil à l'aîne

Corps allongé, à membres grêles

Tête étroite, à museau pointu et œil relativement grand

Queue longue et fine, dans le prolongement du corps



Après plus d'un siècle sans aucune observation – la dernière donnée datant alors de 1860 – l'espèce avait été considérée comme disparue de La Réunion. Mais en 1999, une très petite population a été redécouverte sur une falaise du sud de l'île. L'espèce n'a toutefois plus été détectée depuis 1999, malgré plusieurs campagnes de prospections intensives menées dans les années 2010.

Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



~1970

GECKO INDOPACIFIQUE

Hemiphyllodactylus typus

NA

Mensurations


Lmc nouveau-né : 14–19,5 mm

Ltotale nouveau-né : 28–38 mm


Lmc adulte : 38–60 mm

Ltotale adulte : 70–80 mm

Aspect très élancé (corps "disproportionné")
Absence de tubercules sur la nuque et le dos
(aspect velouté)



Main et pied : le doigt I est vestigial et
en grande partie fusionné au doigt II



Queue longue et fine, préhensile,
sans étranglement à la base

Face ventrale de la queue
rouge brique à orange

Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



GECKO BRIDÉ

Hemidactylus frenatus

NA

Absence de tubercules sur la nuque
(aspect velouté) et quelques rangées de
petits tubercules sur le corps

Mensurations


Lmc nouveau-né : 22 mm

Ltotale nouveau-né : 27–34 mm

Lmc mâle adulte : 35–67 mm

Lmc femelle adulte : 39–61 mm


Ltotale adulte : jusqu'à 14 cm



Aspect velouté

Absence de tubercules
sur la nuque

Bande claire soulignée de
sombre de part et d'autre
de l'œil




Mains : doigts élargis en spatule, présentant
quelques rangées de lamelles (~6–7)

Doigts portant une longue griffe (dépassant
largement des lamelles)



Main

Pieds : les lamelles digitales
atteignent la base des orteils
IV et V



Pied

Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



1874

GECKO À PETITES TACHES

NA

Hemidactylus parvimaculatus

Présence de nombreux grands tubercules, carénés, sur la nuque et le corps

14 à 25 rangées longitudinales de tubercules fortement carénés sur le dos

6 à 10 rangées longitudinales de tubercules sur la queue, au moins à la base



Mensurations

Lmc nouveau-né : 20,6 mm


Ltotale nouveau-né : ~35 mm

Lmc adulte : 40–68 mm


Ltotale adulte : jusqu'à 15 cm



Patron dorsal formé de grandes taches sombres alignées et maculé de points blancs



Pieds : les lamelles digitales atteignent la base des orteils IV et V



Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



2010

GECKO MABOUIA

Hemidactylus mabouia

NA

Mensurations

Lmc nouveau-né : 20–24 mm

Lmc mâle adulte : 42 à 67,9 mm

Lmc femelle adulte : 42 à 72 mm

Ltotale maximale : 16,5 cm


Patron dorsal formé d'une
alternance de chevrons
clairs et sombres

Livrée sombre


Livrée claire

Aspect rugueux

Nombreux tubercules
sur la nuque




Mains : doigts élargis en spatule, présentant
quelques rangées de lamelles (~6–7)
Doigts portant une longue griffe (dépassant
largement des lamelles)



Main

Pieds : les lamelles digitales
n'atteignent pas la base des
orteils IV et V



Pied

Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



GECKO MUTILÉ

Gehyra mutilata

NA

Corps d'aspect lisse, dépourvu de tubercules différenciés

Absence de motif symétrique ; souvent, présence de macules sombres

Mensurations

Lmc nouveau-né : 17–24 mm

Ltotale nouveau-né : 38–49 mm


Lmc mâle adulte : 40,2–61 mm

Lmc femelle adulte : 38–61 mm

Ltotale adulte : jusqu'à 12,5 cm



Juvenile



Livrée claire





Livrée sombre

Main : seuls 4 doigts portent une griffe (dépassant des lamelles) ; le pouce est dépourvu de griffe



Main



Extrémité des doigts et orteils ronde

Souvent une ligne vertébrale claire

Base de la queue rétrécie, puis en forme de carotte

Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



2003

GECKO DES SEYCHELLES

Phelsuma astriata semicarinata


NA

Mensurations

Lmc mâle adulte : jusqu'à 55 mm

Lmc femelle adulte : jusqu'à 56 mm


Ltotale adulte : 11-12,5 cm



Une bande brun gris latérale, bien marquée sur les flancs, sépare nettement le dos vert de la face ventrale blanchâtre

Bande rouge entre l'œil et le museau, longeant les supralabiales

Souvent une tache rouge en V sur le dessus de la tête



Présence possible de taches occipitales et de barres rouges en région temporale

Coloration générale vert clair à vert pomme, avec le plus souvent une fine ligne vertébrale rouge s'étendant de la nuque jusqu'au niveau des reins ; de part et d'autre, présence de taches rouges, plus ou moins marbrées ou vermiformes

Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE INDIGÈNE



Mensurations

Lmc nouveau-né : 20 (?)–30 mm

Ltotale nouveau-né : 40–55 mm

Lmc mâle adulte : 54–83 mm

Lmc femelle adulte : 52–68 mm

Ltotale adulte : 11,5–18 cm

GECKO DE BOURBON

Phelsuma borbonica

EN

Livrée vert à turquoise, très
largement maculée de grandes
taches rouge bordeaux

Tête sombre, ponctuée
de bleu ou de vert

Queue souvent cyan

Souvent une bande
dorso-latérale verte diffuse



Juvenile



Des études récentes montrent que les populations du Gecko vert de Bourbon sont fortement différenciées génétiquement, avec des échanges très limités même entre populations proches. Les analyses révèlent l'existence de deux grandes lignées génétiques séparées depuis au moins 500 000 ans, mais aussi de **cinq groupes génétiques distincts** à l'échelle de l'île. Cette diversité ne correspond pas à la classification actuelle en deux sous-espèces, qui est ainsi remise en question. Certaines populations isolées, notamment au Maïdo, au Cimendef et au Dimitile, présentent une faible connectivité et pourraient être plus vulnérables. Ces résultats soulignent l'existence de plusieurs unités évolutives distinctes devant être prises en compte dans les actions de conservation.

Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE

GRAND GECKO VERT DE MADAGASCAR

Phelsuma grandis

NA



1994

Le plus grand *Phelsuma* de La Réunion


Mensurations

Lmc nouveau-né : 30–50 mm


Ltotale nouveau-né : 65–70 mm

Lmc adulte : 9,5–11,3 cm

Ltotale adulte : 20–33 cm



Ligne rouge épaisse
présente entre l'œil
et la narine



Nouveau-né

Coloration générale vert intense,
parfois homogène mais le plus souvent
ponctuée de taches rouges dorsales

Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE INDIGÈNE

GECKO VERT DE MANAPANY

Phelsuma inexpectata

CR



ENDÉMIQUE

Mensurations


Ltotale nouveau-né : ~20 mm

Lmc mâle adulte : 42–62,5 mm

Lmc femelle adulte : 42–58 mm

Ltotale adulte : 8,5–13,5 cm

Coloration générale verte avec de nombreuses petites taches rouges sur la face dorsale



Une épaisse bande bordeaux à noire s'étend de l'œil jusqu'à la base du bras ; elle est surlignée d'une large bande blanche à cyan



Juvénile

Parfois une plage cyan sur la nuque (surtout chez les mâles)



Femelle



Mâle

Motif de la tête formé d'un triangle bleu (sur le museau) et de trois bandes rouges longitudinales, plus ou moins anastomosées, s'étendant jusqu'aux épaules

Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



1975

GECKO VERT POUSSIÈRE D'OR (GECKO À QUEUE LARGE)

NA

Phelsuma laticauda laticauda


Mensurations

Ltotale nouveau-né : 38–42 mm


Lmc adulte : 46–65 mm

Ltotale adulte : 10–13 cm


Face dorsale de la tête, du corps et de
la queue verte



Face ventrale blanchâtre



La teinte générale peut devenir plus
sombre et terne lors de certaines phases
d'activité ou en situation de stress



Yeux entourés d'un anneau cyan

"Poussière d'or"

Taches ou bande rouges dans la
partie basse du dos (évoquant
souvent une griffure ensanglantée)

Queue large

Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



GECKO LIGNÉ

Phelsuma lineata

NA

Mensurations


Lmc nouveau-né : ~16 mm

Ltotale nouveau-né : 33–43 mm

Lmc adulte : jusqu'à 64 mm

Ltotale adulte : 10,5–14,5 cm

Souvent, une large tache rouge en forme de V sur le museau



Une bande noire épaisse latérale, sur le flanc, séparant nettement le dos vert du ventre jaune, s'élargissant à l'aîne (base de la cuisse)



Coloration générale verte avec une grande tache rouge dorsale, souvent bien définie vers l'avant du corps et fragmentée vers l'arrière



CONFUSION POSSIBLE

Très proche de *Phelsuma pusilla* par la coloration, mais s'en distingue par une taille adulte supérieure :

Lmc adulte (*P. lineata*) : jusqu'à 64 mm, contre 40 mm chez *P. pusilla*

Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



2026

GECKO VERT MINUSCULE

Phelsuma pusilla pusilla

NA


Coloration générale verte à beige avec de petites taches rouges dorsales irrégulières

Mensurations

Lmc adulte : jusqu'à 40 mm

Ltotale adulte : jusqu'à 85 mm

Bande rouge sur le museau et souvent des marques rougeâtres sur le cou derrière les yeux



Une bande noire épaisse latérale, sur le flanc, séparant nettement le dos vert du ventre jaune, s'élargissant à l'aîne (base de la cuisse)

Cercle orbital jaune

Queue d'origine fortement segmentée et souvent mouchetée



CONFUSION POSSIBLE

Très proche de *Phelsuma lineata* par la coloration, mais s'en distingue par une taille adulte nettement plus faible : Lmc adulte (*P. pusilla*) : jusqu'à 40 mm, contre 64 mm chez *P. lineata*. Une confusion avec les jeunes individus de *P. lineata* est donc possible.

Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



2026

Mensurations

Ltotale adulte : 11–12,5 cm

GECKO VERT À QUATRE OCELLES (GECKO DIURNE À QUATRE OCELLES)

NA

Phelsuma quadriocellata bimaculata

Coloration verte avec quelques taches
rouges dorsales irrégulières ou parfois une
ligne rouge interrompue

La coloration verte tend vers le bleu à
l'arrière du corps et la queue est parfois
bleue turquoise



Cercle orbital jaune

Absence de ligne sombre sur les flancs
Ventre blanchâtre



Queue d'origine fortement
segmentée (avec des anneaux
d'écailles plus larges) et
souvent turquoise

Serpents / ELAPIDAE

ESPÈCE MARINE



Mensurations

Lmc nouveau-né : 22–26 cm

Ltotale adulte : 64–110 cm

HYDROPHIDE BICOLORE

Hydrophis platura

NE

Mœurs marines

Largement pélagique, l'espèce est parfois observée, en surface, parmi les bancs de Dauphins (notamment les Péponocéphales) ; elle peut occasionnellement être rencontrée à terre, "échouée" sur la plage

Attention, la morsure est venimeuse et très dangereuse



Inconfondable

Dos noir brillant avec deux bandes latérales jaunes

Ventre jaune, orangé ou brun

Queue aplatie latéralement, en forme de palette ; elle est souvent blanche ou jaune mouchetée ou barrée de noir



Tête allongée avec un museau aplati en forme de "bec"



Queue aplatie latéralement

Serpents / COLUBRIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



COULEUVRE LOUP
(COULEUVRE AULIQUE)

NA

Lycodon aulicus

Mensurations

Lmc nouveau-né : 14 cm



Ltotale adulte : 30-80 cm

Mœurs arboricoles et terrestres

Active surtout la nuit

Coloration miel à brune, marbrée ou annelée

Queue longue et fine



Serpents / TYPHLOPIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



1862

TYPHLOPS BRAHME

Indotyphlops braminus

NA

Mœurs fouisseuses

Coloration dorsale marron lie-de-vin


Mensurations

Lmc nouveau-né : 3,5–7 cm

Ltotale adulte : 9,5–23 cm



Coloration bleue
pendant la mue



Œil petit, positionné dans la
moitié supérieure de l'écaille
oculaire (deux fois plus
haute que large)

Petites glandes claires
alignées en "collier de
perles" sous les écailles
céphaliques



Face ventrale de la tête
et bouche



Cloaque et extrémité de la queue

Tortues / GEOEMYDIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE

ÉMYDE À COU RAYÉ COMMUNE

Mauremys sinensis

NA




Mensurations

Lcarapace nouveau-né : 28–34 mm

Lcarapace mâle adulte : 9,5–20 cm

Lcarapace femelle adulte : 9,8–27 cm

Tête et cou ornés de nombreuses rayures fines longitudinales droites et relativement parallèles, alternativement claires et foncées, depuis le bout du museau jusqu'à la base du cou



Face ventrale

Plastron plus ou moins sombre avec des sutures largement marquées de blanc jaunâtre



Nouveau-né

Tortues / EMYDIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



1989

TRACHÉMYDE ÉCRITE

Trachemys scripta elegans

NA


Tête et cou ornés de lignes longitudinales avec une longue tache temporale rouge

Mensurations

Lcarapace nouveau-né : 23–35 mm

Lcarapace mâle adulte : 9–26,1 cm


Lcarapace femelle adulte : 16–32,8 cm



Femelle adulte

Forme mélanique

Les individus mélaniques présentent une tête sombre dépourvue de motifs




Queue longue

Mâle adulte

Griffes très longues



Face ventrale



Nouveau-né

Tortues / EMYDIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE

TORTUE ÉTOILÉE DE MADAGASCAR

Astrochelys radiata

NA



Mensurations

Lcarapace nouveau-né : 32–43 mm

Lcarapace mâle adulte : 28,5–39,5 cm

Lcarapace femelle adulte : 24,2–48 cm

Mœurs diurnes

Carapace très bombée, presque en dôme chez l'adulte
Chaque écaille, sombre (noire à brun foncé), est ornée de
fines lignes jaunes rayonnantes formant un motif en étoile,
régulier et bien contrasté, donnant à l'ensemble un aspect

très géométrique
Sutures peu apparentes



Nouveau-né

Astrochelys radiata est aujourd'hui très largement présente en captivité chez les Réunionnais. Un article évoque une population d'environ 50 000 adultes sur l'île, avec près de 15 000 naissances annuelles. Le même article indique également que 30 000 à 50 000 Réunionnais posséderaient une Tortue étoilée.

Il n'est donc guère étonnant que l'espèce soit ponctuellement observée dans la nature, même s'il n'existe à ce jour aucune preuve de l'existence d'une population férale établie.

Tortues marines / CHELONIIDAE

ESPÈCE MARINE

REPRODUCTION
À LA RÉUNION

TORTUE VERTE
TORTI D'MER

EN

Chelonia mydas

Carapace couverte de grandes
plaques d'écailles

4 paires d'écailles
costales

Museau à bec
arrondi et
denticulé

Une seule
paire d'écailles
préfrontales

Mensurations

Lcarapace nouveau-né : 2,5–5,9 cm

Lcarapace mâle adulte : > à 64 cm

Lcarapace femelle adulte : 65–153 cm

Nouveau-né

Coloration générale
noire ou bleu nuit
Dossière marginée
de blanc ; gorge et
ventre blancs

ESPÈCE MARINE

TORTUE IMBRIQUÉE
TORTUE CARET

CR

Eretmochelys imbricata

Carapace couverte de grandes
plaques d'écailles

4 paires d'écailles
costales

Museau à bec
allongé, fort et
coupant

Deux paires
d'écailles
préfrontales

Mensurations

Lcarapace nouveau-né : 3,2–4,6 cm

Lcarapace mâle adulte : > à 65 cm

Lcarapace femelle adulte : 51–114 cm

Nouveau-né

Coloration générale
brune à rousse
Dossière non marginée
de blanc ; gorge et
ventre sombres

Tortues marines / CHELONIIDAE

ESPÈCE MARINE



Mensurations

Lcarapace nouveau-né : 3,6–5 cm

Lcarapace mâle adulte : > à 58 cm

Lcarapace femelle adulte : 52–76 cm


TORTUE OLIVÂTRE

Lepidochelys olivacea



DD

Carapace couverte de grandes
plaques d'écailles ; dossière
olivâtre à ocre-brun

5 paires d'écailles
costales ou plus,
souvent asymétriques



2 paires d'écailles
préfrontales



Nouveau-né

Coloration générale
grise à olivâtre
Dossière non marginée
de blanc

ESPÈCE MARINE



Mensurations

Lcarapace nouveau-né : 3,5–5,3 cm

Lcarapace adulte : 55–115 cm


TORTUE CAOUANNE

Caretta caretta



DD

Carapace couverte de grandes
plaques d'écailles
Dossière brun-orangé à brun
rougeâtre

5 paires d'écailles
costales



Préfrontales
fragmentées
en plus de 4
plaques



Nouveau-né

Coloration générale
brune à rousse
Dossière non
marginée de blanc

Tortues marines / DERMOCHELYIDAE

ESPÈCE MARINE




Dossière à l'aspect de cuir; dépourvue d'écailles, parcourue par 7 carènes longitudinales

TORTUE LUTH

NA

Dermochelys coriacea

Tête et membres dépourvus d'écailles, de couleur bleu nuit moucheté de blanc




.....

Mensurations

Lcarapace nouveau-né : 5,1–6,8 cm

Lcarapace mâle adulte : 1,25–2,43 m

Lcarapace femelle adulte : 1,25–1,92 m



Nouveau-né

Dossière couverte de petits granules accolés ; 7 lignes longitudinales de granules blancs sur la dossière

CITATION : Dewynter, M., Baglan, A., Courtois, É., Frétey, T., Sanchez, M., Souchet, J. & Probst, J.-M. (2026) *Guide illustré des Reptiles & des Amphibiens de La Réunion*. *GoodID*, 27: 1-31.

REMERCIEMENTS : Les illustrations de ce guide reposent sur l'exploitation de centaines de clichés réalisés sur le terrain au cours des quinze dernières années. Merci à tous les naturalistes, herpétologues amateurs ou professionnels, qui ont parcouru La Réunion à la recherche des amphibiens et des reptiles et partagé leurs observations ainsi que leurs photographies : Guillaume Amirault, Morgane Barraud, Matteo Bellucci, Chloé Bernet, Sarah Caceres, Matthieu Claeys, Jean-François Cornuaille, Jane Cozette, Laurent Debordes, Aurélien Dessort, Pierre-Yves Fabulet, Joshua Fave-Le Gall, Thomas Guillemaud, Antoine Guilloux, Cédric Hoarau, Dominique Hoareau, Nicolas Huet, James Lefebvre, Rebecca Lippert, Jenni Ly, Cédric Mroczo, François Olliet, Julien Poirion, Martin Riethmuller, Markus Roesch, François Rousseu, Guillaume Roussel, Marc Salamolard, Pierre-Louis Stenger, Julien Triolo, François Vandeschricke et Valentin Vaslet. Merci également aux agents des services en charge de l'environnement qui ont soutenu ce projet.

Nos remerciements à l'équipe de la Société herpétologique de France qui a porté le projet : Anne Lombardi, Adèle Hurabielle, Isabelle Chauvin, Audrey Trochet et Myriam Labadesse.

Ce document a été financé par l'**Office français de la biodiversité** (OFB) et la **DEAL Réunion**. Ce guide est une composante du projet CLEF (Création d'outils pour l'identification des amphibiens et reptiles de France hexagonale et de ses outre-mers) porté par la Société herpétologique de France en partenariat avec PatriNat (centre d'expertise et de données sur le patrimoine naturel). Sa vocation est de soutenir la science participative en permettant aux contributeurs de correctement identifier leurs observations d'amphibiens et de reptiles.



Ce document a été financé par l'**Office français de la biodiversité** (OFB).



Statuts de conservation UICN

Le statut de conservation de chaque espèce est indiqué dans le coin supérieur droit des fiches. Il correspond aux catégories définies par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Lorsque l'information est disponible, il s'agit du statut établi pour La Réunion (UICN France et *al.* 2013). Les espèces exotiques sont considérées comme NA.

-  **LC** Préoccupation mineure : espèce non menacée.
-  **NT** Quasi menacé : espèce proche d'être menacée.
-  **VU** Vulnérable : espèce menacée. Situation inquiétante mais non critique.
-  **EN** En danger : espèce menacée. Situation très inquiétante.
-  **CR** En danger critique d'extinction : espèce menacée proche de l'extinction.
-  **RE** Régionalement éteinte : espèce disparue du territoire, mais présente ailleurs.
-  **NA** Non applicable / Espèce très occasionnelle, visiteuse ou introduite.
-  **DD** Données insuffisantes pour évaluer les menaces.
-  **NE** Non évalué.

NOS PARTENAIRES



Réunion des
Musées
Régionaux



l'observatoire des tortues marines



GoodID

Découvrez la collection GoodID

Une ressource destinée aux naturalistes, gestionnaires d'espaces naturels, enseignants et à tous les passionnés de biodiversité.

<https://collection-goodid.fr>

L'ensemble des publications est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site de la collection.

